

GILIO MARISA, DANTE MERIGHI & FLAVIO POSANTI

ELENCO SISTEMATICO DI ALCUNI
BASIDIO - ASCO - MIXO MICETI
FINORA RINVENUTI NEL TERRITORIO DI ROVERETO
E DINTORNI (TRENTINO MERIDIONALE)

II^a PARTE

Abstract - GILIO MARISA, DANTE MERIGHI & Flavio Posanti - Systematic list of some Basidio - Asco - Myxo mycetes so far found in the territory of Rovereto and surroundings (Southern Trentino).

The Authors report a second portion (order Agaricales and Russulales) of fungi found in the territory of Rovereto and surroundings. The list follows a first part (order *Aphyllophorales* and *Boletales*) published in the number 1 of this Annali.

Key words: Basidio - Asco - Myxo mycetes, Systematic list.

Riassunto - GILIO MARISA, DANTE MERIGHI & Flavio Posanti - Gli Autori riportano una seconda frazione (ordini *Agaricales* e *Russulales*) di funghi rinvenuti nel territorio di Rovereto e dintorni. L'elenco fa seguito ad una prima parte (ordini *Aphyllophorales* e *Boletales*) pubblicata nel volume 1/85 degli Annali dei Musei Civici di Rovereto.

Parole chiave: Basidio - Asco - Mixo miceti, Elenco sistematico.

INTRODUZIONE

In questo secondo contributo allo studio della micoflora lagarina, forse il più consistente (come numero di entità segnalate) fra i tre previsti, si scrivono le specie degli ordini *Agaricales* e *Russulales*. Non essendo questa che una continuazione di un elenco floristico già iniziato nel precedente numero di questi Annali, non si è ritenuto opportuno appesantirla con ripetizioni riferite alla metodologia di ricerca e stesura, informazioni che il lettore troverà nella pubblicazione succitata. Poiché per gli ordini qui trattati sono di enorme importanza la natura del terreno (quasi ubiquitariamente calcarea) e le

associazioni vegetali (varie e con frequenti zone di passaggio a bosco misto) proprie del luogo di tallificazione, ci sembra invece utile citare la «Carta forestale del Trentino, II^a parte, Adige» pubblicata a cura della Provincia Autonoma di Trento (Assessorato alle foreste, parchi naturali, caccia e pesca) e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (Trento), lavoro nel quale si possono trovare informazioni particolareggiate su questi aspetti del territorio.




Fig. 1 - I cerchietti neri evidenziano le principali località di raccolta: 1 Cei; 2 Cimana; 3 Daiano; 4 Bordala; 5 Bordala alta; 6 Monte Biaena; 7 Fac; 8 Castel Pradaglia; 9 Bordina; 10 Festa; 11 Polsa; 12 Zestarei; 13 Monte Zugna; 14 Zugna Torta; 15 Cengio Alto; 16 Costa Violina; 17 Lavini; 18 Val Scodella; 19 Vallunga; 20 Dos delle Gardole; 21 Moietto; 22 Monte Finonchio.

NOTE ESPLICATIVE

La nomenclatura e la sequenza di compilazione sono quelle indicate da Moser M., 1978 (Kleine Kryptogamenflora. Band II 6/2 - Die Röhrlinge und Blätterpilze, Gustav Fischer, Stuttgart, 532 pp., 13 figg.) al quale ci si è anche riferiti nella scelta di suddividere il vecchio ordine *Agaricales* nei due ordini, a nostro parere più coerente con i crismi della moderna tassonomia, *Agaricales* e *Russulales*.

L'elencazione sistematica è stata condotta, nell'ordine attraverso i seguenti *taxa*: classe, ordine, famiglia, specie e, in alcuni casi, sottospecie.

Per ogni specie sono riportati:

- Il Comune, la località di raccolta ed, in alcuni casi tra parentesi, il sito all'interno della località, soprattutto per specie rare o poco diffuse.
- L'habitat, il substrato di crescita e le eventuali associazioni vegetali.
- La diffusione, con le seguenti abbreviazioni: PD = poco diffuso; D = diffuso; DD = molto diffuso.
- La frequenza, con le seguenti abbreviazioni: R = rara; NF = non frequente; F = frequente; C = comune.

Per le specie con notevole diffusione, vengono spesso omesse le località di raccolta e le note di frequenza si intendono estese a tutto il territorio.

- Il numero d'inventario dell'*exsiccatum*, se nell'erbario del Museo Civico esiste un esemplare della specie in questione proveniente dai luoghi esaminati.

ELENCO SISTEMATICO

CLASSE: Basidiomycetes

ORDO: Agaricales *Clements*

FAMILIA: Hygrophoraceae *Roze ex Mre.*

GENUS: *Hygrophorus* Fr.

- *H. agathosmus* (Fr.) Fr.
nei prati ai margini dei boschi; D; C
- *H. arbustivus* Fr.
Isera, Bordala;
presso *Corylus avellana*;
Rovereto, Zugna Torta (Prà);
nel bosco misto; NF
ex. n. 143
- *H. calophyllus* Karst.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; R
- *H. camarophyllus* (A. & S. ex Fr.) Fr.
Ronzo-Chienis, Monte Biaena;
presso *Picea abies*; R

- *H. capreolarius* Kalchbr.
Villa Lagarina, Cei (Costole);
nel bosco misto; R
- *H. chrysodon* (Batsch) Fr.
Isera, Bordala;
al margine della strada in bosco misto; NF
- *H. cossus* (Sow. ex Bk.) Fr.
presso *Fagus sylvatica*; D; C
- *H. dichrous* Kühn. & Romagn. n. nud.
Rovereto, Vallunga; Villa Lagarina, Daiano;
nei boschi cedui; NF
ex. n. 181
- *H. discoideus* (Pers. ex Fr.) Fr.
Rovereto, Monte Zugna;
presso aghifoglie; NF
- *H. eburneus* (Bull. ex Fr.) Fr.
Villa Lagarina, Daiano; Isera, Bordala;
presso *Fagus sylvatica*; F
- *H. erubescens* Fr.
nei boschi misti; DF
- *H. gliocyclus* Fr.
Isera, Bordala;
presso *Larix decidua*;
Rovereto, Val Scodella;
presso *Pinus* sp.; NF
- *H. hyacinthinus* Quél.
Isera, Bordala; Ronzo-Chienis, Monte Biaena;
presso *Picea abies*; NF
- *H. hypothejus* (Fr.) Fr.
Rovereto, Val Scodella;
nel bosco misto; NF
- *H. karstenii* Sacc. & Cub.
Villa Lagarina, Cimana;
presso *Picea abies*; NF
- *H. leucophaeus* (Scop. ex Fr.) Fr.
Rovereto, Vallunga; Mori, Ravazzone;
presso aghifoglie e latifoglie; NF
- *H. limacinus* Scop. ex Fr. (ss. Kühn. & Romagn.)
Rovereto, Val Scodella, Lavini;
presso *Pinus* sp.; NF
- *H. lucorum* Kalchbr.
presso *Larix decidua*; D; C
ex. n. 2

- *H. melizues* Fr.
Villa Lagarina, Daiano;
presso *Betula* sp.; R
- *H. nemoreus* (Lasch) Fr.
Rovereto, Vallunga
nel bosco misto; NF
- *H. olivaceoalbus* (Fr.) Fr.
Rovereto, Monte Zugna; Pomarolo, Val Granda;
presso *Picea abies*; NF
- *H. penarius* Fr.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *H. persicolor* Ricek
Ronzo-Chienis, Monte Biaena;
presso *Picea abies*; NF
- *H. piceae* Kühn.
Isera, Bordala;
presso *Picea abies*; R
- *H. poetarum* Heim
Isera, Bordala;
presso *Fagus sylvatica*; NF
- *H. pudorinus* (Fr.) Fr.
Villa Lagarina, Cei (Biasi);
nel bosco con prevalenza di *Picea abies* e *Abies alba*; NF
- *H. pustulatus* (Pers. ex Fr.) Fr.
Villa Lagarina, Cei;
presso aghifoglie; NF
- *H. queletii* Bres.
Isera, Bordala;
presso *Larix decidua*; NF
- *H. russula* (Schff. ex Fr.) Quél.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto;
Villa Lagarina, Trasiel;
nel bosco misto di latifoglie; F
- *H. speciosus* Peck
presso *Larix decidua*; D; F

GENUS: *Camarophyllus* Kummer

- *C. colemannianus* (Blox. ex Fr.) Ri.
Brentonico, Polsa;
nei prati; NF
- *C. fuscescens* (Bres.) Mos.
nei prati sopra i 600 m; D; NF
ex. n. 182

- *C. lacmus* Fr.
Isera, Bordala;
in un prato esposto a nord fra il muschio; R
- *C. niveus* (Scop. ex Fr.) Karst.
nei prati sopra gli 800 m; D; F
ex. n. 1
- *C. pratensis* (Pers. ex Fr.) Karst.
nei prati sopra gli 800 m; D; C
- *C. russocoriaceus* Bk. & Br.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *C. subradiatus* (Schum. ex Fr.) Wünsche
Isera, Bordala;
nei prati; NF
- *C. virgineus* (Wulf. ex Fr.) Karst.
nei prati sopra i 600 m; D; F
ex. n. 174

GENUS: *Hygrocybe* Kummer

- *H. acutoconica* (Clements) Sing.
Rovereto, Val Scodella;
presso *Pinus nigra*; NF
- *H. brevispora* Möll.
Isera, Bordala (Le Cune);
presso *Corylus avellana* e *Picea abies*; R
- *H. cantharellus* (Schw.) Murr.
Isera, Bordala (Le Cune);
presso *Corylus avellana* e *Picea abies*; R
- *H. ceracea* (Wulf. ex Fr.) Karst.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *H. chlorophana* (Fr.) Karst.
Isera, Bordala;
nei prati fra l'erba alta; NF
- *H. citrinovirens* (Lge.) J. Schff.
Villa Lagarina, Cimana; Isera, Bordala;
presso *Larix decidua*; NF
- *H. coccinea* (Schff. ex Fr.) Kummer
nei prati sopra gli 800 m; D; F
- *H. conica* (Scop. ex Fr.) Kummer
Brentonico, Polsa;
nei prati; D; F
- *H. fornicata* (Fr.) Sing.
Isera, Bordala; (Costom);
nei prati; R

- *H. ingrata* Jens. & Möll.
Brentonico, Polsa;
nei prati; R
- *H. insipida* (Lge. ex Lund.) Mos.
Rovereto, Vallunga;
fra l'erba nel bosco rado; NF
- *H. intermedius* (Pass.) Fay.
nei prati sopra gli 800 m; D; NF
- *H. marchii* Bres.
Villa Lagarina, Cimana;
nei prati; R
- *H. miniata* (Fr.) Kummer
Brentonico, Polsa;
nei prati; NF
- *H. murinacea* (Fr.) Mos.
Isera, Bordala;
nei prati; NF
- *H. nigrescens* (Quél.) Kühn.
nei prati sopra i 600/700 m; D; F
- *H. obrussea* (Fr.) Wünsche
Isera, Bordala, (Costom);
nei prati; NF
- *H. ovinea* (Bull. ex Fr.) Kühn.
Isera, Bordala;
nei prati; NF
- *H. psittacina* (Schff. ex Fr.) Karst.
nei prati; D; F
ex. n. 180
- *H. punicea* (Fr.) Kummer
Brentonico, Polsa;
nei prati; D; F
- *H. quieta* (Kühn.) Sing.
nei prati; D; F
ex. n. 172
- *H. reai* R. Mre.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *H. spadicea* (Scop. ex Fr.) Karst.
Isera, Bordala (Le Cune);
presso *Corylus avellana* e *Picea abies*; R
- *H. streptopus* Sing. & Kuthan
Rovereto, Zugna Torta (Prà);
nei prati; R

- *H. tristis* (Pers.) Möll.
Isera, Bordala (Le Cune);
nei prati; NF
- *H. turunda* (Fr. ex Fr.) Karst.
Isera, Bordala;
lungo il margine stradale; R
- *H. unguinosa* (Fr.) Karst.
Isera, Bordala;
presso cespugli di *Fagus sylvatica*; R
- *H. vitellina* (Fr.) Karst.
Isera, Bordala;
al margine del bosco; R

GENUS: *Hygrotrama* Sing.

- *H. atropunctum* (Pers. ex Fr.) Sing.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
ex. n. 188

FAMILIA: *Tricholomataceae* Roze ex Overeem

GENUS: *Omphalina* Quél.

- *O. pyxidata* (Bull. ex Fr.) Quél.
Rovereto, Val Scodella;
nei prati aridi; NF
- *O. cyanophilla* (Fr.) Court. & Bon
Villa Lagarina, Cei;
su ceppo marcescente; R
ex. n. 30

GENUS: *Gerronema* Sing.

- *G. chrysophillum* (Fr.) Sing.
Rovereto, città;
su segatura; R

GENUS: *Rickenella* Raith.

- *R. fibula* (Bull. ex Fr.) Raith.
Isera, Bordala (Le Cune);
nei prati fra erba e muschio; NF
- *R. setipes* (Fr.) Raith.
Isera, Bordala;
nei boschi e prati muscosi; NF

GENUS: *Laccaria* Bk. & Br.

- *L. amethystea* (Bull.) Murr.
nei boschi misti sopra i 700 m; D; F
- *L. bicolor* (R. Mre.) Orton
Isera, Bordala;
nel bosco misto;
Villa Lagarina, Cei;
presso *Betula* sp.; NF
- *L. laccata* (Scop. ex Fr.) Bk. & Br.
nei boschi misti; D; F
- *L. proxima* (Boud.) Pat.
Isera, Bordala;
ai margini del bosco; NF
- *L. tortilis* (Bolt.) S.F. Gray
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto su terreno nudo; R

GENUS: *Clitocybe* Kummer

- *C. alexandri* (Gil.) Korn.
nei boschi misti con presenza di *Pinus nigra*; D; F
- *C. clavipes* (Pers. ex Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; F
- *C. concava* (Scop. ex Fr.) Gill.
Isera, Bordala;
presso aghifoglie; R
- *C. costata* (Kühn. & Romagn.)
Villa Lagarina, Nasupel;
nel bosco misto; F
- *C. dealbata* (Sow. ex Fr.) Kummer
Rovereto, Costa Violina;
ai margini del bosco; NF
- *C. ericetorum* Bull. ex Quél.
Rovereto, Zugna Torta (Prà);
ai margini del bosco misto; NF
- *C. expallens* (Pers. ex Fr.) Kummer ss. Bres.
Brentonico, Polsa;
fra il muschio ai margini del bosco misto con *Corylus avellana*;
in sito ombroso; R
- *C. fragrans* (Sow. ex Fr.) Kummer
Rovereto, Costa Violina;
fra il muschio nel bosco misto; F
- *C. geotropa* (Bull. ex Fr.) Quél.
nei prati sovente in semicerchi; D; F

- *C. gibba* (Pers. ex Fr.) Kummer
nei boschi misti; D; C
- *C. hydrogramma* (Bull. ex Fr.) Kummer
Mori, Fae;
presso *Pinus sylvestris*,
Brentonico, Polsa;
presso latifoglia; NF
- *C. inornata* (Sow. ex Fr.) Gill.
Brentonico, Polsa; Mori, Tierno;
presso *Corylus avellana*; D: NF
ex n. 9
- *C. lignatilis* (Pers. ex Fr.) Karst.
Rovereto. città;
su ceppo di *Populus nigra*; R
- *C. maxima* (Fl. Wett. ex Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Bordala;
nelle schiarite di bosco misto in file; R
- *C. odora* (Bull. ex Fr.) Kummer
nei boschi; D; F
ex. n. 135
- *C. paropsis* (Fr.) Quél. ss. Bres.
Brentonico, Polsa;
nei prati; R
- *C. radicellata* Gill.
Villa Lagarina, Cei;
all'inizio della primavera sotto *Larix decidua*; R
- *C. sinopica* (Fr. ex Fr.) Kummer
Brentonico, Saccone; Rovereto, Madonna del Monte;
ai margini del bosco misto; NF
ex. n. 44
- *C. squamulosa* (Pers. ex Fr.) Lge.
Ronzo-Chienis, Bordala alta;
nel bosco misto, NF
- *C. suaveolens* (Schum. ex Fr.) Kummer
Rovereto, Val Scodella;
fra il muschio in siti ombroso sotto *Corylus avellana*; NF
- *C. vermicularis* (Fr.) Quél.
Brentonico, Polsa;
nel prato in vicinanza di *Larix decidua*; R

GENUS: *Lepista* (Fr.)

- *L. caespitosa* (Bres.) Sing.
Ronzo-Chienis, Bordala alta;
nei prati; NF

- *L. gilva* (Pers. ex Fr.) Roze
Villa Lagarina, Cei; Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; F
- *L. glaucocana* (Bres.) Sing.
nei boschi misti; D; F
- *L. inversa* (Scop. ex Fr.) Pat.
Villa Lagarina, Cei; Isera, Bordala;
presso *Picea abies*; F
- *L. irina* (Fr.) Bigelow
nei boschi misti; D; F
- *L. lentiginosa* (Fr.) Brsky.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; NF
- *L. nebularis* (Fr.) Harmaja
nei boschi misti; D; C
ex. n. 8
- *L. nuda* (Bull. ex Fr.) Cke.
nei boschi misti sopra gli 800 m; D; F
- *L. personata* (Fr. ex Fr.) Cke.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto con prevalenza di *Fagus sylvatica*; R
- *L. piperata* Ricek
Ronzo-Chienis, Bordala alta;
nei prati; NF
- *L. rickenii* Sing.
Isera, Bordala; Villa Lagarina, Cei;
nei prati in file; NF
- *L. sordida* (Fr.) Sing.
nei prati e giardini con latifoglie; D; NF

GENUS: *Ripartites* Karst.

- *R. tricholoma* (A. & S. ex Fr.) Karst.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; R
ex. n. 24

GENUS: *Tricholomopsis* Sing.

- *T. decora* (Fr.) Sing.
Rovereto, Lavini (Mira);
su vecchio ceppo di conifera; R
- *T. rutilans* (Schff. ex Fr.) Sing.
su tronchi di aghifoglie; D; NF

GENUS: *Tricholoma* (Fr.) Quél.

- *T. acerbum* (Bull. ex Fr.) Quél.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; NF
- *T. albatum* (Quél.) Maubl. & d'Astis
Isera, Bordala;
vicino ad un ceppo di *Fagus sylvatica*; R
- *T. album* (Schff. ex Fr.) Quél.
Rovereto, Monte Finonchio (malga);
nel bosco misto; R
- *T. argyraceum* (Bull. ex Fr.) Sacc.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; R
- *T. atosquamosum* (Chev.) Sacc.
Isera, Bordala; Rovereto, Monte Zugna;
presso *Picea abies*; NF
- *T. aurantium* (Schff. ex Fr.) Ri.
nei boschi con prevalenza di aghifoglie sopra gli 800 m; D; NF
- *T. batschii* Gulden
presso *Pinus sp.*; D; F
- *T. bresadolianum* Clç.
Villa Lagarina, Cei; Isera, Bordala;
nel bosco misto; NF
- *T. bufonium* (Pers. ex Fr.) Gill.
nei boschi misti sopra gli 800 m; D; F
- *T. caligatum* (Viv.) Ri.
Villa Lagarina, Cimana;
nel bosco misto; R
- *T. cingulatum* (Fr.) Jacobasch
Isera, Nagustel; Villa Lagarina, Cei (Praiol);
ai margini del bosco misto; NF
- *T. colossum* (Fr.) Quél.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; R
- *T. columbetta* (Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; R
- *T. flavobrunneum* (Fr.) Kummer
sopra gli 800 m sotto *Betula sp.*; D; NF
- *T. flavovirens* (Pers. ex Fr.) Lund. & Nannf.
nei boschi misti sopra gli 800 m; D; NF
- *T. gausapatum* (Fr.) Quél.
presso conifere; D; F
- *T. guttatum* (Schff. ex Fr.) Sacc.
Ala, Serravalle;
presso *Pinus nigra*; R
- *T. imbricatum* (Fr. ex Fr.) Kummer
Rovereto, Zugna Torta (Malga Tof);
nel bosco misto; NF
- *T. inamoenum* (Fr.) Quél.
Isera, Bordala; Brentonico, Polsa;
presso conifere; R
- *T. lascivum* (Fr.) Gill.
Brentonico, Polsa;
presso *Fagus sylvatica*; R
- *T. luridum* (Schff. ex Fr.) Quél.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; R
- *T. orirubens* Quél.
nel bosco misto; D; NF
- *T. pardinum* Quél.
nei boschi misti sopra gli 800 m; D; NF
- *T. portentosum* (Fr.) Quél.
Mori, Fae; Brentonico, Prada;
nel bosco misto; NF
- *T. populinum* Lge.
Rovereto, Zugna Torta (Prà);
presso *Populus tremula*; NF
- *T. saponaceum* (Fr.) Kummer
nei boschi misti sopra gli 800 m; D; C
- *T. psammopus* (Kalchbr.) Quél.
sopra gli 800 m presso *Larix decidua*; D; F
- *T. sculpturatum* (Fr.) Quél.
nei boschi misti con presenza di *Larix decidua* e *Corylus avellana*; D; NF
- *T. sciodes* (Secr.) Mart.
Villa Lagarina, Cei;
presso *Fagus sylvatica*;
Isera, Bordala;
nel bosco misto; NF
- *T. sejunctum* (Sow. ex Fr.) Quél.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; F
- *T. sejunctum* var. *coryphaeum* (Fr.)
Villa Lagarina, Cei;
presso *Fagus sylvatica*; R
- *T. squarulosum* Bres.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; NF

- *T. sulphureus* Bres.
Isera, Bordala;
presso *Fagus sylvatica*; R
- *T. sulphureum* (Bull. ex Fr.) Kummer
nei boschi sopra gli 800 m; D; NF
- *T. triste* (Scop. ex Fr.) Quél.
Ronzo-Chienis, Bordala alta;
presso *Picea abies*; R
- *T. ustaloides* Romagn.
Brentonico, Polsa;
presso *Fagus sylvatica*; NF
- *T. vaccinum* (Pers. ex Fr.) Kummer
ai margini dei boschi di conifere sopra 800 m; D; F
- *T. virgatum* (Fr. ex Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto;
Isera, Bordala;
presso conifere; NF

GENUS: *Armillariella* Karst.

- *A. mellea* (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) Karst.
su ceppaie di diverse essenze; DD; C

GENUS: *Leptoglossum* Karst.

- *L. muscigenum* (Bull. ex Fr.) Karst.
Rovereto, Zugna Torta (Malga Tof);
su muschio; R

GENUS: *Lyophyllum* Karst.

- *L. connatum* (Schum. ex Fr.) Sing.
Mori, Fae;
nel bosco di *Pinus sylvestris*; NF
- *L. decastes* (Fr.) Sing.
Villa Lagarina, Cei;
presso *Fagus sylvatica*;
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto *Pinus sp.* e *Quercus sp.*; F
Isera, Ischia;
presso *Populus nigra*; NF
ex. n. 60
- *L. fumosum* (Pers. ex Fr.) Kühn. & Romagn. ex Orton
nelle schiarite dei boschi in file; D; F
- *L. immundum* (Bk.) Kühn.
Rovereto, Val Scodella;
nel bosco misto di *Pinus sp.* e *Fraxinus ornus*; R

- *L. infumatum* (Bres.) Kühn.
nei boschi misti di *Pinus sp.* e *Fraxinus ornus*; D; F
- *L. loricatum* (Fr.) Kühn.
Rovereto, Borgo Sacco;
in riva all'Adige sulla sabbia; NF
- *L. semitale* (Fr.) Kühn.
Rovereto, Val Scodella;
presso *Pinus nigra*; R

GENUS: *Tephrocycbe* Donk

- *T. ambusta* (Fr. ex Fr.) Donk
Rovereto, Vallunga;
su terreno bruciato, stesso sito ove 15 gg. prima rinvenuta *T. atrata*; NF
- *T. atrata* (Fr. ex Fr.) Donk
Rovereto, Vallunga;
su terreno bruciato; NF
- *T. rancida* (Fr.) Donk
Mori, Fae;
nel bosco di *Pinus sylvestris*; NF

GENUS: *Calocybe* Kühn. ex Donk

- *C. carnea* (Bull. ex Fr.) Donk
Brentonico, S. Giacomo;
nei prati; R
- *C. gambosa* (Fr.) Donk
nei prati; D; F
ex. n. 70
- *C. gambosa* var. *flavida* (Clusius ex Fr.) Quél.
Isera, Bordala;
fra l'erba al margine del bosco; NF
ex. n. 26
- *C. ionides* (Bull. ex Fr.) Donk
nei prati; PD; R
- *C. persicolor* Sing.
Brentonico, Festa;
nei prati; R

GENUS: *Pseudoclitocybe* (Sing.) Sing.

- *P. cyathiformis* (Bull. ex Fr.) Sing.
Isera, Bordala;
ai margini del bosco misto di *Pinus sylvestris* e *Fagus sylvatica*; NF
- *P. expallens* (Pers. ex Fr.) Mos.
Brentonico, Polsa;
al margine del bosco misto; R

- *P. obbata* (Fr.) Sing.
Brentonico, Polsa;
al margine del bosco di latifoglie fra il muschio; R

GENUS: *Porpoloma* Sing.

- *P. pes-caprae* (Fr.) Sing.
Isera, Bordala; Brentonico, Polsa;
nei prati; NF

GENUS: *Leucopaxillus* Bours.

- *L. candidus* (Bres.) Sing.
Isera, Bordala; Rovereto, Monte Zugna;
nei prati, in file; F
- *L. gentianeus* (Quél.) Kotl.
Isera, Bordala; Villa Lagarina, Cei;
presso *Picea abies*; NF
- *L. paradoxus* (Cost. & Dufour) Bours.
Isera, Bordala;
ai margini del bosco misto; NF
- *L. tricolor* (Peck) Kühn.
Isera, Bordala;
nel bosco misto, osservato una sola volta; R

GENUS: *Melanoleuca* Pat.

- *M. cognata* (Fr.) K. & M.
Isera, Bordala; Villa Lagarina, Cei; Rovereto, Monte Zugna;
nei boschi misti; NF
- *M. graminicola* (Vel.) Kühn. & Mre.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; F
- *M. grammopodia* (Bull. ex Fr.) Pat.
Isera, Bordala;
nei prati e nei boschi anche in file; F
- *M. melaleuca* (Pers. ex Fr.) Murr.
nelle schiarite dei boschi misti; D; F
- *M. strictipes* (Karst.) Murr.
nei prati sopra gli 800 m; D; C
- *M. subalpina* (Britz.) Brsky. & Stangl.
Isera, Bordala;
al margine del bosco misto con *Corylus avellana*; NF
- *M. subbrevipes* Metr.
nei prati sopra gli 800 m; D; NF

GENUS: *Catathelasma* Lovej

- *C. imperiale* (Fr.) Sing.
nei boschi misti; D; F

GENUS: *Collybia* Kummer

- *C. acervata* (Fr.) Karst.
nei boschi sopra gli 800 m; D; NF
- *C. butyracea* (Bull. ex Fr.) Quél.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco; NF
- *C. butyracea* var. *asema* Fr.
nei boschi; DD; F
- *C. cirrhata* (Schum. ex Fr.) Kummer
Rovereto, Vallunga;
su resti marcescenti di russule nigricantine; NF
- *C. confluens* (Pers. ex Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco; F
- *C. dryophila* (Bull. ex Fr.) Kummer
nei boschi ed ai loro margini; DD; C
ex. n. 18
- *C. fusipes* (Bull. ex Fr.) Quél.
Villa Lagarina, Cei; Rovereto, Vallunga;
attorno a tronchi di piante vive di *Quercus sp.*; F
- *C. hariolorum* (D.C. ex Fr.) Quél. ss. Fav., Kühn. & Romagn.
Villa Lagarina, Cei; Isera, Bordala; Rovereto, Val Scodella;
su foglie di *Fagus sylvatica*; F
ex. n. 27
- *C. maculata* (A. & S. ex Fr.) Quél.
nei boschi misti; D; F
- *C. marasmioides* (Britz.) Brsky. & Stangl
Villa Lagarina, Cei; Ronzo-Chienis, Monte Biaena;
nei boschi ai bordi di strada forestale; NF
- *C. obscura* Fav.
fra le foglie sotto *Fagus sylvatica*; R
- *C. peronata* (Bolt. ex Fr.) Sing.
nei boschi misti con prevalenza di *Fagus sylvatica*; D; F
- *C. proluxa* (Hornem. ex Fr.) Gill.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; R
- *C. tuberosa* (Schum. ex Fr.) Kummer
Rovereto, Vallunga;
su resti marcescenti di russule nigricantine; NF

GENUS: *Marasmiellus* Murr.

- *M. ramealis* (Bull. ex Fr.) Sing.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto su ramoscelli marcescenti; F

GENUS: *Micromphale* Nees ex S.F. Gray

- *M. brassicolens* (Romagn.) Orton
Rovereto, Val Scodella; Lavini; Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto su fogliame; NF
ex. n. 31
- *M. foetidum* (Sow. ex Fr.) Sing.
Rovereto, Vallunga;
su rami morti di *Corylus avellana*; NF
- *M. perforans* (Hofm. ex Fr.) Sing.
su aghi caduti di *Picea abies*; D; C

GENUS: *Hohenbuehelia* Schulz.

- *H. atrocoerulea* (Fr.) Sing.
Rovereto, città;
su pianta morta di *Laburnum anagyroides*; R
- *H. geogenia* (D.C. ex Fr.) Sing.
Rovereto, città
su strato di fogliame e rami marcescenti; NF
- *H. petaloides* (Bull. ex Fr.) Schulz.
Rovereto, Vallunga;
su ceppo di *Quercus* sp.; R

GENUS: *Panellus* Karst.

- *P. mitis* (Pers. ex Fr.) Sing.
Isera, Bordala;
su ramo di *Picea abies*; R
Trambileno, Fratielle
su rametti caduti di *Larix decidua*; NF
ex. n. 331
- *P. serotinus* (Pers. ex Fr.) Kühn.
Rovereto, Val Scodella;
su legno di *Carpinus betulus*; R
- *P. stypticus* (Bull. ex Fr.) Karst.
su ceppi di latifoglie; D; F

GENUS: *Oudemansiella* Speg.

- *Ou. badia* (Quél.) Mos.
Rovereto, Vallunga, Val Scodella; Brentonico, Castione;
nel bosco misto; NF
ex. n. 112
- *Ou. longipes* (Bull. ex St. Am.) Mos.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF

- *Ou. mucida* (Schrad. ex Fr.) v. H.
Villa Lagarina, Cei;
su tronco vico di *Fagus sylvatica*; NF
- *Ou. nigra* Dörfelt
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *Ou. platyphilla* (Pers. ex Fr.) Mos.
Villa Lagarina, Cei;
su ceppo di *Pinus sylvestris*; NF
- *Ou. radicata* (Relhan ex Fr.) Sing.
nei boschi; D; C

GENUS: *Strobilurus* Sing.

- *St. esculentus* (Wulf. ex Fr.) Sing.
su tronchi di *Picea abies*; D; C
ex. n. 13
- *St. stephanocystis* (Hora) Sing.
su strobili di *Pinus* sp.; D; F
- *St. tenacellus* (Pers. ex Fr.) Sing.
su strobili di *Pinus* sp.; D; F

GENUS: *Marasmius* Fr.

- *M. aliaceus* (Jacq. ex Fr.) Fr.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; R
- *M. androsaceus* (L. ex Fr.) Fr.
Rovereto, Vallunga;
su corteccia di latifoglie; F
- *M. bulliardii* Quél.
Isera, Bordala; Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; R
- *M. cohaerens* (Pers. ex Fr.) Fr.
Rovereto, Moietto;
nel bosco misto; R
- *M. collinus* (Scop. ex Fr.) Sing.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; R
- *M. epiphyllus* (Pers. ex Fr.) Fr.
Rovereto, Vallunga, Val Scodella;
su foglie di *Quercus* sp.; F
- *M. graminum* (Libert) Bk.
Rovereto, Val Scodella;
su steli d'erba; R
- *M. oreades* (Bolt. ex Fr.) Fr.
nei prati a cerchi; D; C

- *M. prasiosmus* (Fr.) Fr.
Brentonico, Polsa;
fra l'erba in una schiarita del bosco; NF
- *M. rotula* (Scop. ex Fr.) Fr.
su ceppi e rami morti; D; F
- *M. scorodonius* (Fr.) Fr.
su legno e aghi di conifere; D; F
- *M. splachnoides* Fr.
Rovereto, Vallunga;
su foglie di *Quercus* sp.; NF
- *M. wynnei* Bk. & Br.
nei boschi; D; F

GENUS: *Macrocystidia* Heim

- *M. cucumis* (Pers. ex Fr.) Heim
Mori, Fae;
nel bosco misto; R

GENUS: *Crinipellis* Pat.

- *C. stipitaria* (Fr.) Pat.
Rovereto, Val Scodella;
su graminaceae morte; R

GENUS: *Mycena* (Pers. ex Fr.) S.F. Gray

- *M. alba* Bres.
Rovereto, città;
su alberi vivi di latifoglie; D; C
- *M. adonis* (Bull. ex Fr.) S.F. Gray
Mori, Fae;
nel bosco di *Pinus sylvestris*; R
- *M. aurantiomarginata* (Fr.) Quél.
Ronzo-Chienis, Monte Biaena;
nel bosco misto; NF
- *M. citrinella* (Pers. ex Fr.) Quél.
nei boschi di conifere; D; F
- *M. epipterygia* (Scop. ex Fr.) S.F. Gray
nei boschi e ai margini; D; F
ex. n. 274
- *M. epipterygioides* Pears.
Rovereto, Vallunga;
fra il muschio; NF
- *M. erubescens* v. H.
Brentonico, Polsa;
su ceppo di *Fagus sylvatica*; R

- *M. flavoalba* (Fr.) Quél.
Rovereto, Vallunga, Valeriana;
nei boschi misti fra l'erba; C
- *M. galericulata* (Scop. ex Fr.) S.F. Gray
su ceppi di latifoglie e aghifoglie; DD; C
- *M. galopoda* (Pers. ex Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco fra l'erba; NF
- *M. inclinata* (Fr.) Quél.
Rovereto, Vallunga;
su latifoglie in parte viva; NF
- *M. maculata* Karst.
Rovereto, Vallunga;
su ceppi di *Quercus* sp.; NF
- *M. pelianthina* (Fr.) Quél.
nei boschi di *Fagus sylvatica*; D; NF
- *M. plumbea* (Fr.) Sacc.
Isera, Bordala;
presso aghifoglie; R
- *M. polygramma* (Bull. ex Fr.) S.F. Gray
nei boschi; D; F
ex. n. 12
- *M. pura* (Pers. ex Fr.) Kummer
nei boschi; DD; C
- *M. rorida* (Pers. ex Fr.) Quél.
Rovereto, Val Scodella;
nel bosco misto; R
- *M. rosella* (Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
presso *Picea abies*; NF
- *M. strobilicola* Fav. & Kühn.
Villa Lagarina, Cei (Cà Marisa);
su strobili di *Picea abies*; F
- *M. stylobates* (Pers. ex Fr.) Kummer
Rovereto, Vallunga;
su foglie di *Quercus* sp.; R
- *M. viridimarginata* Karst.
Rovereto, Monte Zugna;
su ceppo di *Picea abies*; R
- *M. viscosa* (Secr.) R. Mre.
Villa Lagarina, Cei; Isera, Bordala;
su ceppi di aghifoglie; NF
- *M. vitilis* (Fr.) Quél.
Rovereto, Vallunga;
fra l'erba nel bosco misto; NF

- *M. vulgaris* (Pers. ex Fr.) Quél.
Villa Lagarina, Cei;
su aghi di *Picea abies*; NF
- *M. zephirus* (Fr. ex Fr.) Kummer
Isera, Bordala;
nel bosco di conifere; NF

GENUS: *Dermoloma* (Lge) Sing. ex Herink
— *D. atrocinerium* (Pers. ex Pers.) Herink
nei prati e nei boschi di latifoglie; D; F
ex. n. 176

GENUS: *Myxomphalia* Hora
— *M. maura* (Fr.) Hora
Rovereto, Val Scodella, Vallunga;
nei luoghi bruciati; R

GENUS: *Xeromphalina* R. Mre
— *X. campanella* (Batsch ex Fr.) R. Mre
su ceppi marcescenti di conifere; D; F

— *X. fellea* R. Mre & Mal.
Isera, Bordala;
ai margini di un sentiero in bosco di *Pinus sylvestris*; R

GENUS: *Baeospora* Sing.
— *B. myosura* (Fr.) Sing.
Rovereto, Zugna Torta (Prà);
su strobili di *Pinus sylvestris*; R

GENUS: *Flammulina* Karst.
— *F. velutipes* (Curt. ex Fr.) Sing.
su tronchi vivi di varie latifoglie; D; F
ex. n. 75

FAMILIA: Entolomataceae

GENUS: *Rhodocybe* R. Mre
— *R. mundula* (Lasch) Sing.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R

— *R. nitellina* (Fr.) Sing.
Villa Lagarina, Nasupel, Cei;
nel bosco misto; NF

- *R. obscura* (Pil.) Mos.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *R. truncata* (Schff. ex Fr.) Sing.
Rovereto, Zugna Torta (Malga Tof); Isera, Bordala;
nel bosco misto; NF

GENUS: *Clitopilus* Kummer
— *C. prunulus* (Scop. ex Fr.) Kummer
nei prati e nelle schiarite erbose dei boschi; D; F

GENUS: *Entoloma* (Fr.) Kummer
— *E. byssisedum* (Pers. ex Fr.) Donk
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto su terreno nudo; R

— *E. excentricum* Bres.
Rovereto, Val Scodella;
nel bosco misto con prevalenza di *Pinus nigra* e *Fraxinus ornus*; R

— *E. hirtipes* (Schum. ex Fr.) Mos.
Villa Lagarina, Daiano;
su terreno erboso; NF
ex. n. 278

— *E. incanum* (Fr.) Hesler
nelle schiarite erbose dei boschi; D; F

— *E. lividoalbum* (Kühn. & Romagn.) Mos.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; NF

— *E. madidum* (Fr.) Gill.
Villa Lagarina, Cei;
al margine di un bosco misto; R

— *E. mammosum* (Fr.) Hesler
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; NF

— *E. nidorosum* (Fr.) Quél.
nei boschi; D; F

— *E. nitidum* Quél.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; R

— *E. porphyropheum* (Fr.) Karst.
Isera, Bordala;
al margine di un bosco misto; R

— *E. sericeum* (Bull. ex Merat) Quél.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R

- *E. sinuatum* (Bull. ex Fr.) Kummer
Rovereto, Vallunga; Mori, Besagno;
nel bosco misto; NF
ex. n. 320 X
- *E. staurosporum* (Bres.) Hk.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF

FAMILIA: **Pluteaceae** Kotl. & Pouz.

GENUS: *Valvariella* Speg.

- *V. bombycina* (Pers. ex Fr.) Sing.
Rovereto, città;
su tronchi di latifoglie vive; F
ex. n. 310 X
- *V. hypopithys* (Fr. ex Karst.) Mos.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *V. pusilla* (Pers. ex Fr.) Sing.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *V. speciosa* (Fr.) Sing.
Rovereto, Lizzana;
nei campi; PD; D (in certe annate)
- *V. speciosa* var. *gloiocephala* (D.C. ex Fr.) Sing.
Rovereto, Lizzana;
nei campi; PD; C (in certe annate)
- *V. taylori* (Bk.) Sing.
Rovereto, città (stab. Pirelli);
su mucchi di polvere di cotone; R
- *V. volvacea* (Bull. ex Fr.) Sing.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R

GENUS: *Pluteus* Fr.

- *P. alborugosus* Kühn. (n. nud.)
Rovereto, Monte Zugna;
nel bosco misto; R
- *P. atricapillus* (Secr.) Sing.
su ceppi di aghifoglie e latifoglie; D; F
- *P. atromarginatus* (Konr.) Kühn.
Isera, Bordala; Villa Lagarina, Cei; Rovereto, Monte Zugna;
su ceppi di *Picea abies*; NF

- *P. leoninus* (Schff. ex Fr.) Kummer
Isera, Bordala;
su ceppaia di latifoglie; R
- *P. murinus* Bres. ss. Romagn.
Villa Lagarina, Cei; Isera, Bordala;
su ceppi di *Fagus sylvatica*; NF
- *P. pellitus* (Pers. ex Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; NF
- *P. pusillulus* Romagn.
Rovereto, città;
su tronchetto di *Populus* sp. invaso da micelio di *Pleurotes ostreatus*; R
- *P. romellii* (Britz.) Sacc.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *P. roseipes* v. H.
Villa Lagarina, Cei;
su assi marcescenti; R
- *P. umbrosus* (Pers. ex Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
su ceppo di *Fagus sylvatica*; R
- *P. villosus* (Bull.) ss. Decary, Romagn.
Villa Lagarina, Cei;
su ceppo di *Fagus sylvatica*; NF

FAMILIA: **Amanitaceae** Roze

GENUS: *Amanita* Pers. ex Hooker

- *A. alba* Gill.
Villa Lagarina, Daiano;
nel prato al margine del bosco; R
- *A. aspera* (Fr.) Hooker
Rovereto, Vallunga; Zugna Torta;
nel bosco misto; R
ex. n. 145
- *A. aureola* Kalchbr.
Isera, Bordala;
presso *Picea abies*; R
- *A. caesaria* (Scop. ex Fr.) Pers. ex Schw.
Rovereto, Vallunga; Zugna Torta; Mori, Besagno;
nel bosco misto; R
ex. n. 133
- *A. citrina* (Schff.) S.F. Gray
nei boschi di conifere e caducifoglie; DD; C

- *A. citrina* var. *alba* (Vitt.) Gill.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *A. crocea* (Quél.) Sing.
Brentonico, Castione;
presso *Castanea sativa*; R
- *A. echinocephala* (Vitt.) Quél.
Isera, Foianeghe;
nel bosco ceduo; R
- *A. excelsa* (Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; NF
- *A. fulva* (Schff. ex Pers.)
Brentonico, Polsa;
nel pascolo ai margini del bosco con prevalenza di *Fagus sylvatica*; R
- *A. muscaria* (L. ex Fr.) Hooker
sopra gli 800/900 m specialmente presso *Picea abies* e *Betula sp.*; D; F
ex. n. 142
- *A. ovoidea* (Bull. ex Fr.) Quél.
Rovereto, Monte Finonchio;
nel bosco misto; R
- *A. pantherina* (D.C. ex Fr.) Secr.
sopra gli 800/900 m nei prati; D; F
- *A. pantherina* var. *abietum* Gilb.
Pomarolo, Cimana;
nei prati al margine del bosco misto; R
- *A. phalloides* (Vaill. ex Fr.) Secr.
Rovereto, Vallunga, Valeriana;
nel bosco misto; D; F
- *A. phalloides* var. *alba* (Vitt.) Gill.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *A. rubescens* (Pers. ex Fr.) S.F. Gray
sopra gli 800 m nei boschi con prevalenza di aghifoglie; D; F
- *A. rubescens* var. *annulosulfurea* Gill.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco con prevalenza di *Picea abies*; NF
- *A. solitaria* (Bull. ex Fr.) Kummer
Rovereto, città; Villa Lagarina, Cei;
nei giardini, aiuole, margini stradali; NF
- *A. spissa* (Fr.) Kummer var. *excelsa* (Fr.)
Villa Lagarina, Cei (Costole);
nel bosco misto; NF
ex. n. 3

- *A. strangulata* Fr.
Villa Lagarina, Cei; Isera, Bordala;
nei prati boschivi; R
- *A. umbrinolutea* Secr.
Villa Lagarina, Cei; Isera, Bordala;
nei prati boschivi presso *Picea abies*; F
- *A. vaginata* (Bull. ex Fr.) Quél.
nei prati e pascoli al margine dei boschi; D; F
- *A. virosa* (Fr.) Bertillon
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R

FAMILIA: **Agaricaceae** Fr.

GENUS: *Agaricus* L. ex Fr.

- *A. abruptibulbus* Peck
nei boschi misti; D; C
- *A. augustus* Fr.
Villa Lagarina, Trasiel; Rovereto, Vallunga;
nel bosco con prevalenza di *Picea abies*; e *Fagus sylvatica*; NF
- *A. bitorquis* (Quél.) Sacc.
Rovereto, zona industriale;
ai margini di una strada asfaltata; NF
ex. n. 305
- *A. bresadolianus* Boh.
Rovereto, Lizzanella;
in un giardino; R
ex. n. 218
- *A. campester* (L.) Fr.
Brentonico, Polsa;
nei pascoli in file; NF
- *A. perrarus* Schulz.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *A. placomyces* Peck
Rovereto, Costa Violina;
nel bosco di latifoglie; C (in certe annate)
- *A. silvaticus* Schff. ex Secr.
nei boschi con prevalenza di aghifoglie; D; NF
- *A. silvicola* (Vitt.) Sacc.
nei boschi misti; D; F
- *A. xanthodermus* Gen.
Isera, dintorni;
in un prato al margine di bosco ceduo; R

GENUS: *Chamaemyces* Bat. ex Earle

- *Ch. fracidus* (Fr.) Donk
Rovereto, Vallunga; Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; R

GENUS: *Lepiota* (Pers.) S.F. Gray em. Pat.

- *L. aspera* (Pers. in Hofm. ex Fr.) Quél.
nei boschi; D; F
- *L. clypeolaria* (Bull. ex Fr.) Kummer
nei boschi; D; F
- *L. cristata* (A. & S. ex Fr.) Kummer
su terreno nudo ai margini delle strade forestali; D; C
- *L. heriophora* Peck
Rovereto, città;
su terreno sabbioso presso *Cupressus* sp. e *Cedrus* sp.; NF
ex. n. 167
- *L. irrorata* Quél.
Villa Lagarina, Cei (Bellaria);
nelprato accanto a vecchia ceppaia di *Larix decidua*; NF
- *L. josserandii* Bon & Boiffard
Rovereto, Lizzana;
in un giardino; R
- *L. ventriospora* Reid
nei boschi; D; F

GENUS: *Macrolepiota* Sing.

- *M. excoriata* (Schff. ex Fr.) Quél.
nei prati e pascoli; D; F
- *M. procera* (Scop. ex Fr.) Sing.
nelle schiarite dei boschi; DD; C
- *M. rhacodes* (Vitt.) Sing.
Brentonico, Polsa;
fra *Urtica dioica*; NF

GENUS: *Leucoagaricus* (Locq.) Sing.

- *L. cinerascens* (Quél.) Mos.
Volano, dintorni;
fra l'erba al margine del bosco; NF
- *L. pudicus* (Bull.)
Rovereto, città;
fra l'erba nei parchi e giardini; F

GENUS: *Leucocoprinus* Pat.

- *L. birnbaumii* (Corda) Sing.
in un vaso di fiori; R

— *L. bresadolae* (Schulz.) Mos.

- Rovereto, Mori Stazione;
in un vaso di fiori; R

GENUS: *Cystoderma* Fay.

- *C. amiantinum* (Scop. ex Fr.) Fay.
fra il muschio nei boschi; D; C
- *C. carcharias* (Pers. ex Secr.) Fay.
nei boschi; D; F

FAMILIA: *Coprinaceae* Roze ex Orvereem

GENUS: *Coprinus* (Pers.) S.F. Gray

- *C. alopecia* Lasch ex Fr.
Rovereto, città (giardini Milano);
in un aiuola; R
- *C. angulatus* Peck
Rovereto, Vallunga;
su terreno bruciato; NF
- *C. atramentarius* (Bull. ex Fr.) Fr.
su terreno in prossimità di latifoglie; D; F
ex. n. 295X
- *C. comatus* (Müll. in Fl. Dan. ex Fr.) S.F. Gray
nei prati ai margini delle strade; D; C
- *C. disseminatus* (Pers. ex Fr.) S.F. Gray
Rovereto, Lizzanella, Lavini;
ai piedi di un *Salix* sp.; NF
su ceppo marcescente di *Populus nigra*; NF
ex. n. 329X
- *C. leiocephalus* Orton
Rovereto, città (Museo Civico);
in un paludario, su legno ghiaietta e fra il muschio; R
ex. n. 306
- *C. micaceus* (Bull. ex Fr.) Fr.
Rovereto, città;
sulla base terrosa di *Quercus ilex*; NF
- *C. niveus* (Pers. ex Fr.) Fr.
Villa Lagarina, Cei;
su sterco bovino; D; NF
- *C. picaceus* (Bull.) Fr.
Villa Lagarina, Daiano;
nel prato al margine del bosco; R
- *C. plicatilis* (Curt. ex Fr.) Fr.
ai margini di sentieri erbosi; D; NF

- *C. truncorum* (Schff.) Fr.
Rovereto, Lizzanella;
su ceppo di *Populus nigra*; NF

GENUS: *Panaeolus* (Fr.) Quél.

- *P. rickenii* Hora
Rovereto, Monte Zugna;
in una schiarita di bosco; R
- *P. sphinctrinus* (Fr.) Quél.
Villa Lagarina, Cei;
su sterco bovino; F

GENUS: *Anelaria* Karst.

- *A. semiovata* (Sow. ex Fr.) Pears. & Dennis
su escrementi; D; NF

GENUS: *Psathyrella* (Fr.) Quél.

- *P. candolleana* (Fr.) Mre.
fra l'erba nelle aiuole e negli orti, presso piante e ceppi di latifoglie; D; F
- *P. fusca* (Schum. ex Fr.) Pears.
Rovereto, Monte Zugna;
sotto latifoglie; R
- *P. velutina* (Pers. ex Fr.) Sing.
lungo i sentieri, in campi e giardini su terreni piuttosto sabbiosi; D; NF
ex. n. 169

FAMILIA: **Bolbitiaceae** Sing.

GENUS: *Conocybe* Fay.

- *C. tenera* (Schff. ex Fr.) Kühn.
fra l'erba nei boschi misti; D; NF

GENUS: *Pholiotina* Fay.

- *Ph. aporos* (K. v. W.) Clç.
Isera, Bordala;
lungo un sentiero nel bosco di conifere; R

GENUS: *Bolbitius* Fr.

- *B. vitellinus* (Pers.) Fr.
Villa Lagarina, Cei;
su resti di stracci marcescenti; R

GENUS: *Agrocybe* Fay.

- *A. aegerita* (Brig.) Sing.
Rovereto, città;
su tronchi di varie latifoglie vegetanti; NF
ex. n. 321
- *A. dura* (Bolt. ex Fr.) Sing.
su terreni piuttosto sterili, in zone urbane; D; NF
- *A. erebia* (Fr.) Kühn.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; R
- *A. praecox* (Pers. ex Fr.) Fay.
nei campi e giardini fra l'erba o su scorzami o detriti legnosi; D; F
ex. n. 300

FAMILIA: **Strophariaceae** Sing. & Smith

GENUS: *Stropharia* (Fr.) Quél.

- nei boschi specialmente fra ramaglie marcescenti; D; F
- *St. cyanea* (Bolt. ex Secr.) Toumoukoski
Isera, Bordala;
al margine del bosco; NF
- *St. coronilla* (Bull. ex Fr.) Quél.
ai margini delle strade su terreni piuttosto sabbiosi; D; NF
- *St. semiglobata* (Batsch ex Fr.) Quél.
sopra i 700/800 m su sterco bovino; D; NF

GENUS: *Hypholoma* (Fr.) Kummer

- *H. capnoides* (Fr. ex Fr.) Kummer
su tronchi, ceppaie e radici di conifere, cespitoso; D; F
- *H. fasciculare* (Huds. ex Fr.) Kummer
su ceppaie di conifere e latifoglie; D; C
- *H. marginatum* (Pers. ex Fr.) Schroet.
Isera, Bordala;
su ceppo di *Picea abies*; R
- *H. sublateritium* (Fr.) Quél.
alla base o su radici di latifoglie; D; C
ex. n. 150

GENUS: *Pholiota* Kummer

- *Ph. adiposa* (Fr.) Kummer
Brentonico, Polsa;
su legno di latifoglie; R
- *Ph. astragalina* (Fr.) Sing.
sopra gli 800/900 m su ceppi di conifere; D; NF

- *Ph. carbonaia* (Fr.) Sing.
Rovereto, Corna Calda, Vallunga;
su vecchi focolai, carboni e ceneri di luoghi bruciati; NF
- *Ph. destruens* (Brond.) Quél.
su legno vivo o da poco tagliato di *Populus sp.* D; NF
ex. n. 281
- *Ph. flammans* (Fr.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
su ceppo di aghifoglia; R
- *Ph. lenta* (Pers. ex Fr.) Sing.
su ramaglie marcescenti; D; NF
- *Ph. lubrica* (Pers. ex Fr.) Sing.
Rovereto, Monte Zugna;
su rami marcescenti di latifoglie; R
- *Ph. lucifera* (Lasch) Quél.
Rovereto, zona industriale, Vallunga;
su rametti seminterrati; NF
- *Ph. squarrosa* (Pers. ex Fr.) Kummer
Brentonico, S. Giacomo;
alla base di *Fagus sylvatica*; NF

GENUS: *Kuehneromyces* Sing. & Smith

- *K. mutabilis* (Schff. ex Fr.) Sing. & Smith
Isera, Bordala; Rovereto, Val Zibia;
su ceppaie di conifere e latifoglie; F

GENUS: *Phaeomarasmius* Scherffel

- *Ph. erinaceus* (Fr.) Kühn.
Villa Lagarina, Cei;
su ramoscello morto di *Fagus sylvatica*; R

GENUS: *Tubaria* (W.G. Smith) Gill.

- *T. hiemalis* Rom. ex Bon
Rovereto, città;
su piccolo ceppo di latifoglie;
Trambileno, Val Scodella;
lungo un sentiero su detriti legnosi e terreno; NF
ex. n. 331

FAMILIA: *Crepidotaceae* (Imai) Sing.

GENUS: *Crepidotus* (Fr.) Kummer

- *C. cesatii* Rab.
Rovereto, Monte Zugna;
su ramoscello di *Picea abies*; R

- *C. mollis* (Schff. ex Fr.) Kummer
Rovereto, Borgo Sacco; Villa Lagarina, Cei;
su ceppo di latifoglie; R
ex. n. 90
- *C. pubescens* Bres.
Rovereto, città
su ramoscelli di varie latifoglie; NF
- *C. sphaerosporus* (Pat.) Lge
Rovereto, Val Scodella;
su ramo morto di *Corylus avellana*; NF

FAMILIA: *Cortinariaceae* Roze

GENUS: *Inocybe* Fr.

- *I. atripes* Atk.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *C. cincinnata* (Fr.) Quél. (ss. lat.)
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *I. corydalina* Quél.
Rovereto, Monte Zugna
nel bosco misto; R
- *I. dulcamara* (A. & S. ex Pers.) Kummer
Villa Lagarina, Cei;
lungo un sentiero nel bosco; NF
- *I. fastigiata* (Schff. ex Fr.) Quél.
fra l'erba nei giardini e ai margini dei boschi; DD; F
- *I. geophylla* (Sow. ex Fr.) Kummer
nei boschi; D; F
ex. n. 170
- *I. terrigena* (Fr.) Kühn.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; NF

GENUS: *Hebeloma* Kummer

- *H. birrum* Fr.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *H. crustuliniforme* (Bull. ex Fr.) Quél.
nei boschi misti; D; F
- *H. mesophaeum* (Pers. ex Fr.) Quél.
presso aghifoglie; D; C
- *H. radicosum* (Bull. ex Fr.) Ri.
Isera, Bordala;
fra l'erba presso cespugli di *Fagus sylvatica*; NF

GENUS: *Gymnopilus* Karst.

- *G. bellulus* (Peck) Murr.
Rovereto, Val Scodella;
su rametti interrati caduti da alcune essenze arbustive; R
- *G. hybridus* (Fr. ex Fr.) Sing.
su rami e strobili caduti di *Pinus nigra*; D; C
ex. n. 7 et n. 173

GENUS: *Dermocybe* (Fr.) Wünsche

- *D. cinnabarina* (Fr.) Wünsche
Rovereto, Monte Zugna; Villa Lagarina, Cei;
nei boschi con prevalenza di conifere; NF
ex. n. 120
- *D. sanguinea* (Wulf. ex Fr.) Wünsche
Isera, Bordala (Le Cune);
nel bosco umido con prevalenza di conifere; R
- *D. seminsanguinea* (Fr.) Mos.
Rovereto, Monte Zugna;
nel bosco umido con prevalenza di conifere; R

GENUS: *Cortinatius* Fr.

- *C. atrovirens* Kalchbr.
Rovereto, Monte Zugna;
presso aghifoglie; R
- *C. calochrous* Fr.
Rovereto, Zugna Torta (Prà);
bosco di latifoglie; R
- *C. camphoratus* Fr.
Rovereto, Vallunga; Brentonico, Polsa;
nei boschi misti; D; F
- *C. caninus* (Fr.) Fr.
Vallarsa, Albaredo; Rovereto, Monte Zugna;
nel bosco misto; NF
- *C. collinitus* Fr.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; NF
- *C. cotoneus* Fr.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *C. crassus* Fr.
Isera, Bordala;
sotto *Larix decidua*; R
- *C. croceo-coeruleus* (Pers. ex Fr.) Fr.
Brentonico, Polsa;
sotto *Fagus sylvatica*; R

- *C. cumatilis* Fr.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; NF
- *C. cyanites* Fr.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; R
- *C. delibutus* Fr.
Isera, Bordala;
presso *Pinus sylvestris*; NF
- *C. elegantior* Fr.
Isera, Bordala;
presso *Pinus sylvestris*; R
- *C. gentilis* (Fr.) Fr.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; R
- *C. glaucescens* (J. Schff. ap. Mos.) Mos.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *C. galucopus* (Schff. ex Fr.) Fr.
Brentonico, Polsa;
presso *Picea abies*; D; F
- *C. guttatus* Hry
Ronzo-Chienis, Monte Biaena (Dos della Benella);
presso *Picea abies*; R
- *C. hemitrichus* Fr.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *C. herpeticus* Fr.
Rovereto, Monte Finonchio (Malga);
nel bosco misto; R
- *C. infractus* (Pers. ex Fr.) Fr.
nei boschi misti; D; F
- *C. odorifer* Britz.
sopra gli 800 m presso conifere; D; F
- *C. orichalceus* Fr.
sopra i 700/800 m nei boschi misti; D; F
- *C. percomins* Fr.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; R
- *C. pistorius* J. Schff.
Villa Lagarina, paese;
fra l'erba presso *Ostrya carpinifolia*
ex. n. 323

- *C. praestans* (Cord.) Gill.
Rovereto, Zugna Torta; Mori, Zof;
nel bosco ceduo; D; F
- *C. rubicundulus* (Rea) Pears.
Mori, Fae;
presso latifoglie; R
- *C. rufoolivaceus* Fr.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *C. spilomeus* (Fr. ex Fr.)
Rovereto, Zugna Torta (Prà);
fra l'erba al margine del bosco misto; NF
- *C. splendens* Hry
Brentonico, Polsa;
nel bosco misto; R
- *C. traganus* Fr.
sopra gli 800 m nei boschi con prevalenza di aghifoglie; D; NF
- *C. torvus* (Bull. ex Fr.) Fr.
Rovereto, Val Scodella;
sotto latifoglie; NF
- *C. trivialis* Lge
nei boschi misti; D; F
- *C. triumphans* (Fr.) Fr.
Brentonico, Zestarei;
sotto *Populus tremula*; R
- *C. variegatus* Fr.
Isera, Bordala; Villa Lagarina, Cei;
nei boschi con prevalenza di aghifoglie; D; F
- *C. variatus* Bres.
Isera, Bordala;
sotto *Pinus sylvestris*; R
- *C. varius* Fr.
Isera, Bordala;
sotto *Pinus sylvestris*; NF
- *C. violaceus* (L. ex Fr.) Fr.
Isera, Bordala; Villa Lagarina, Daiano;
nei boschi misti sotto latifoglie; R
- *C. volvatus* A.H. Smith
Isera, Bordala;
presso *Fagus sylvatica*; R

GENUS: *Galerina* Earle

- *G. beinrothii* Brsky.
Trambileno, Porte;
nel bosco misto; R

- *G. calyptrata* Orton
Rovereto, Val Scodella;
nel bosco misto; R
- *G. hypnorum* (Schrank ex Fr.) Kühn.
nei luoghi muscosi dei boschi; D; F
- *G. marginata* (Fr.) Kühn.
su rami morti e ceppi di conifere; D; C
- *G. paludosa* (Fr.) Kühn.
Isera, Bordala;
fra il muschio ai bordi di un bosco; R

ORDO: Russulales Kreis.

FAMILIA: Russulaceae Roze

GENUS: *Russula* Pers. ex S.F. Gray

- *R. acrifolia* Romagn.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; R
- *R. adusta* Fr.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; NF
- *R. aeruginea* Lindbl.
Brentonico, Polsa;
presso *Betula sp.*; NF
- *R. albonigra* Krbh.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *R. aurata* (With.) ex Fr.
nei boschi misti; D; F
- *R. badia* QuéL.
Rovereto, Val Scodella;
presso *Pinus nigra*; R
- *R. cavipes* Britz. (ss. Heim)
Villa Lagarina, Cei;
presso *Picea abies*; NF
- *R. chamaelontina* (Fr.) Fr. ss. Romagn.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *R. chloroides* Krbh.
nei boschi; D; C
- *R. coerulea* Fr.
Rovereto, Vallunga, Lavini (la Mira);
presso *Pinus nigra*; NF

- *R. cyanoxantha* Schff. ex Fr.
nei boschi; D; C
- *R. decipiens* (Sing.) Kühn. & Romagn.
Rovereto, Val Scodella;
nel bosco misto; NF
- *R. delica* Fr.
nei boschi; D; C
- *R. densifolia* Secr.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; NF
- *R. emetica* Fr.
nei boschi; D; F
- *R. faginea* Romagn.
Villa Lagarina, Cei;
sotto *Fagus sylvatica*; R
- *R. farinipes* Rom. Ap. Britz.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
ex. n. 144
- *R. fellea* Fr.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; NF
- *R. flava* (Rom.) Rom. ap. Lindbl.
Brentonico, Zestarei;
presso *Betula sp.*; R
- *R. foetens* Fr.
nei boschi; D; C
- *R. gracilis* Burl.
Brentonico, Polsa;
presso *Betula sp.*; R
- *R. heterophilla* (Fr.) Fr.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *R. illota* Romagn.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *R. integra* L. ex Fr. ss. Mre
sopra gli 800 m sotto aghifoglie; D; NF
- *R. laurocerasi* Melz. var. *fragrans* Romagn.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *R. lutea* (Huds. ex Fr.) S.F. Gray
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF

- *R. luteotacta* Rea
Isera, Bordala;
nel prato presso *Corylus avellana* e *Larix decidua*; R
- *R. maculata* Quél. & Roz.
nei boschi; D; F
- *R. mairei* Sing.
nei boschi cedui; D; F
- *R. medullata* Romagn.
Rovereto, Vallunga;
nei boschi misti; D; F
- *R. melliolens* Quél.
Villa Lagarina, Cei;
presso *Fagus sylvatica*; R
- *R. mustellina* Fr.
sopra i 700 m nei boschi con prevalenza di conifere; D; NF
- *R. nigricans* (Bull.) Fr.
nei boschi; D; NF
- *R. ochroleuca* (Pers.) ex Fr.
Isera, Bordala;
nel bosco misto; R
- *R. olivacea* (Schff. ex Secr.) Fr.
sotto *Fagus sylvatica*; D; C
- *R. olivascens* Pers. ex S.F. Gray
sopra i 700 m presso *Picea abies*; D; NF
- *R. pectinatoides* Peck
nei boschi di latifoglie; D; NF
- *R. pelargonica* Niolle
Pomarolo, Cimana;
presso *Populus tremula*; R
- *R. persicina* Krbh. em. Melz. & Zv.
nel bosco ceduo; D; NF
- *R. puellaris* Fr.
nei boschi; D; F
- *R. queletii* Fr. in Quél.
presso *Picea abies*; D; F
- *R. raoultii* Quél.
Rovereto, Zugna Torta (Malga Tof);
nel bosco misto; D; NF
- *R. romellii* R. Mre
Villa Lagarina, Cei; Isera, Bordala;
nel bosco misto; F
- *R. rosacea* Pers. ex S.F. Gray
nei boschi; D; F

- *R. rosea* Quél.
Villa Lagarina, Cei; Isera, Bordala;
nel bosco misto; PD; NF
- *R. roseipes* Secr. ss. Bres.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; NF
- *R. rubra* Krbh.
Isera, Bordala;
presso *Pinus sylvestris*; R
- *R. sanguinea* (Bull. ex St. Am.) Fr.
nei boschi misti con prevalenza di aghifoglie; D; C
- *R. solaris* Ferd. & Winge
Villa Lagarina, Cei (Pra dell'Albi);
nel bosco misto; R
- *R. torulosa* Bres.
presso *Pinus sylvestris*; D; F
- *R. versicolor* J. Schff.
Brentonico, Polsa;
presso *Betula sp.*; R
- *R. vesca* Fr.
nei boschi misti; D; NF
- *R. vetermosa* Fr. ss. J. Schff.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *R. vinosa* Lindbl.
Rovereto, Monte Zugna;
presso *Picea abies*; NF
- *R. virescens* (Schff. ex Zant.) Fr.
nel bosco misto; D; NF
ex. n. 87 et n. 136
- *R. xerampelina* (Schff. ex Secr.) Fr.
nei boschi di conifere; D; F

GENUS: *Lactarius* (D.C. ex Fr.) S.F. Gray

- *L. acerrimus* Britz.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *L. acris* Bolt. ex Fr.
presso *Fagus sylvatica*; D; F
- *L. aspideus* Fr.
Villa Lagarina, Nasupel;
nel bosco misto; NF
- *L. badiosanguineus* Kühn. & Romagn.
Rovereto, Monte Zugna;
nel bosco misto; R

- *L. blennius* Fr.
presso *Fagus sylvatica*; D; C
- *L. bertillonii* (Nh. ex Z. Sch.) Bon var. *queletii* Bl.
nei boschi; D; F
- *L. chrysorrheus* Fr.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *L. citriolens* Pouz.
Isera, Bordala;
presso *Pinus sylvestris*; NF
- *L. controversus* Pers. ex Fr.
Brentonico, Polsa;
sul pascolo sotto *Populus sp.*; R
- *L. decipiens* Quél.
Nogaredo, Sasso; Rovereto, Vallunga;
rispettivamente nel bosco ceduo e misto; NF
- *L. deliciosus* Fr.
presso *Pinus sp.*; D; NF
- *L. deterrimus* Gröger
presso *Picea abies*; D; C
- *L. glaucescens* Crossl.
nei boschi; D; NF
- *L. glyciosmus* Fr.
Brentonico, Polsa;
presso *Betula sp.*; NF
ex. n. 138
- *L. helvus* Fr.
Brentonico, Polsa;
presso *Betula sp.*; R
- *L. necator* (Bull. ex Fr.) Karst.
Villa Lagarina, Cei;
nel bosco misto; R
- *L. pallidus* Pers. ex Fr.
nei boschi misti particolarmente sotto *Fagus sylvatica*; D; C
- *L. pergamenus* (Swartz ex Fr.) Fr.
nei boschi; D; NF
- *L. picinus* Fr.
Ronzo-Chienis, Bordala alta;
presso *Picea abies*; NF
- *L. piperatus* (L. ex Fr.) S.F. Gray
nei boschi; D; C
- *L. pominsis* Roll.
presso *Larix decidua*; D; C
- *L. pterosporus* Romagn.
nei boschi misti; D; NF

- *L. pyrogalus* Bull. ex Fr.
sopra i 700 m presso *Corylus avellana*; D; NF
- *L. quietus* Fr.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *L. resimus* Fr.
Brentonico, Polsa;
presso *Betula sp.*; R
- *L. rubrocinctus* Fr.
Isera, Bordala;
presso *Fagus sylvatica* vicino anche qualche *Picea abies*; R
- *L. rufus* (Scop.) Fr.
sopra gli 800 m nei boschi; D; F
- *L. sanguifluus* (Paulet ex Fr.) Fr.
sotto *Pinus sp.*; D; F
- *L. scrobiculatus* (Scop. ex Fr.) Fr.
sopra i 700/800 m nei boschi; DD; C
- *L. semisanguifluus* Heim & Lecl.
presso *Pinus sp.*; D; F
- *L. torminosus* (Schff. ex Fr.) S.F. Gray
Rovereto, Monte Zugna; Brentonico, Festa, Polsa;
presso *Betula sp.*; F
ex. n. 134
- *L. uvidus* Fr.
nei boschi misti; D; F
- *L. vellereus* (Fr.) Fr.
nei boschi; D; F
- *L. vellereus* var. *hometii* Sow. ex G.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *L. violascens* (Otto) Fr.
Rovereto, Vallunga;
nel bosco misto; R
- *L. volemus* Fr.
nei boschi misti; D; NF

BIBLIOGRAFIA

- BLUM J., 1962 - Les russules, *Paul Lechevalier*, Paris, 227 pp.
- BOUDIER E., 1905-1910 - Icones micologicae *Librairie des Sciences Naturelle (Paul Klincksied-Leon Lhomme successeur)*, Paris, 1/4: 350, 600 figg.
- BOURDOT H. & GALZIN A., 1928 - Hymenomycetes de France, *Maerzel Bry*, Sceaux, 764 pp.
- BRESADOLA G., 1933 - Iconographia, *Soc. Bot. It.*, Milano, 1/26: 148, 1246 figg.
- CAPPELLI A., 1984 - Agaricus, *Libreria Editrice Biella Giovanna*, Saronno, 560 pp., 70 figg.
- CETTO B., 1970-1973 - I funghi dal vero, *Saturnia*, Trento, 1/4: 2739, 1693 figg.
- COBELLI R., 1881 - Elenco dei funghi della Valle Lagarina, *Michelia*, 8: 227, 240 figg.
- COBELLI R., 1885 - Elenco sistematico degli Imeno-Disco-Gasteromiceti e Tuberacei finora trovati nella Valle Lagarina, *Tipografia Roveretana*, Rovereto, 23 pp.
- COBELLI R. 1891 - Contribuzione alla flora micologica della Valle Lagarina, *Verb. Zool. Bot. Ges.*, 41: 581, 584 figg.
- CORNER E.J.H., 1983 - Ad polyporaceas, *Cramer*, Vaduz, 1: 184, 31 figg.
- DALLA TORRE K.W. & SARNTHEIN L.G., 1900 - Die Litteratur der Flor von Tirol, Voralberg und Liechtestein *Wagner'schen Universitäts - Buchhandlung*. Innsbruck.
- DALLA TORRE K.W. & SARNTHEIN L.G., 1905 - Die Pilze (Fungi) von Tirol, Voralberg und Liechtestein. *Wagner'schen Universitäts - Buchhandlung*. Innsbruck.
- DEMOULIN V., 1969 - Les gasteromycetes, *Les Naturalistes Belges*, Bruxelles, 59 pp., 25 figg.
- DENNIS R.W.G., 1981 - British ascomycetes, *Cramer*, Vaduz, 585 pp., 79 figg.
- ESSETTE H., 1964 - Les psalliotes, *Paul Lechevalier*, Paris, 50 pp., 57 figg.
- JAHN H., 1963 - Mitteleuropäische Porlinge und ihr Vorkommen in Westfalen. *J. Cramer*, Germany, 143 pp., 30 figg.
- JAHN H., 1971 - Steroide Pilze in Europa, *Westfälische Pilzbrieft*, Detmold-Heiligenkirchen, 176 pp., 83 figg.
- JÜLICH W., 1984 - Kleine Kryptogamenflora Band II b/1 Die Nichtblätterpilze-Gallerpilze-Bauchpilze, *Gustav Fischer*, Stuttgart, 626 pp., 15 figg.
- KONRAD P. & MAUBLANC A., 1924/1937 - Icones selectae fungorum, *Paul Lechevalier*, Paris, 1/6: 500.
- KÜHNER R. & ROMAGNESI H., 1957 - Flore analytique des champignons supérieurs, *Masson et Cie*, Paris, 556 pp., 677 figg.
- LANGE J.E., 1935 - Flora agaricina danica, Copenhagen, 575 pp., 200 figg.
- LAZZERI G., 1980 - Glossario micologico in cinque lingue, *Gruppo Micologico G. Bresadola*, Trento, 165 pp.
- LECLAIR A. & ESSETTE H., 1969 - Les bolets, *Paul Lechevalier*, Paris, 81 pp., 72 figg.
- MAAS GEESTERANUS R.A., 1975 - Die terrestrischen Stachelpilze Europas, *North Holland*, Amsterdam, *Publishing Company*, London, 167 pp., 40 figg.
- MARCHAND A., 1971-1973 - Champignons du Nord et du Midi, *Société Mycologique de Pyrénées Méditerranéennes*, Perpignan, 1/8: 2236, 800 figg.

- MARTIN G.W. & ALEXOPOULUS C.J., 1969 - The Myxomycetes, *University of Iowa*, 561 pp., 41 figg.
- MERLO ERICA G. ROSSO M. & TRAVERSO M., 1980 - I boleti, *Sagep Editrice*, Genova, 127 pp., 97 figg.
- MERLO ERICA G. & TRAVERSO M., 1983 - Le amaniti, *Sagep Editrice*, Genova, 151 pp., 132 figg.
- MICHAEL E. & HENNING B., 1968-1970 - Handbuch für Pilzfreunde, *Veb Gustav Fischer*, Jena, 1: 1778 pp., 1200 figg.
- MOSER M., 1960 - Die gattung Phlegmacium, *Julius Klinkhardt*, Bad Heilbrunn, 447 pp., 32 figg.
- MOSER M., 1963 - Kleine Kryptogamenflora. Band II. Ascomyceten, *Gustav Fischer*, Stuttgart, 146 pp., 7 figg.
- MOSER M., 1978 - Kleine kryptogamenflora. Band II 6/2 Die Röhrlinge und Blätterpilze, *Gustav Fischer*, Stuttgart, 532 pp., 13 figg.
- NEÜHOFF W., 1956 - Die milchinge (lactarii), *Verlag Julius Klinkhardt*, Bad Heilbrunn Abb., 248 pp., 20 figg.
- OVERHOLTS L.O., 1953 - The polyporaceae of the Unites States, Alaska and Canada, *Ann Arbor the University of Michigan Press*, 466 pp., 132 figg.
- RICKEN A., 1915 - Die Blätterpilze (Agaricacea), *Theodor Oswald Weigel*, Lipsia, 413 pp., 112 figg.
- ROMAGNESI H., 1967 - Les russules d'Europe et d'Afrique du Nord, *Editions Boards*, France, 998 pp., 1129 figg.
- UNIONE SVIZZERA DELLE SOCIETÀ MICOLOGICHE, 1967-1975 - *Tavole svizzere di funghi*, Aarau, 1/5: 349 figg.

Indirizzi degli autori:

Gilio Marisa, Dante Merighi: c/o Gruppo Micologico e protezione flora «G. Barbacovi»
Piazza Follone, 39 - 38068 Rovereto.

Flavio Posanti: c/o Sezione Archeologia, Storia e Scienze Naturali dei Musei Civici di Rovereto
Via Calcinari, 18 - 38068 Rovereto.
